



O plano AniAid para o seu patudo

Principais cuidados a ter com o seu Cão

Vacinação

- Às 8 semanas, iniciar Parvovirose, Esgana, Hepatite, Leptospirose, Parainfluenza (primovacinação com 2 ou 3 tomas da vacina, completa até às 16 semanas).
- Raiva + Microchip (antes dos 6 meses).
- Leishmaniose (a partir dos 6 meses, com teste prévio obrigatório)
- Revacinações anuais (Leptospirose, Leishmaniose), trianuais (Raiva), bianuais (Parvovirose, Esgana, Hepatite, Parainfluenza).
- Se o seu animal for para um hotel ou canil, por favor fale connosco para que seja vacinado para a Tosse do Canil.

Desparasitação

- Interna (para "lombrigas")
 - até aos 3 meses: de 15 em 15 dias.
 - dos 3 aos 6 meses: mensalmente
 - dos 6 meses à idade adulta: de 4 em 4 meses
- Externa (para pulgas, carraças e mosquitos)
 - em comprimido, pipeta ou coleira.

Alimentação

- Água sempre à disposição
- Alimento seco (ração) preferencialmente.
- 3 refeições diárias (preferencialmente e sobretudo em cachorros!). No mínimo, 2 refeições diárias.

Outros cuidados

- Escovagem regular do pêlo e dos dentes.
- Limpeza semanal dos pavilhões auriculares.
- A esterilização deverá ser efectuada por volta dos 6 meses de idade.
- Contacto com outros animais e idas a rua só depois da primovacinação estar completa!



O plano AniAid para o seu patudo

Principais cuidados a ter com o seu Gato

Vacinação

- Às 8 semanas, iniciar Rinotraqueíte vírica, Clamidiose, Panleucopenia e Calicivirose (primovacinação com 3 tomas da vacina, completa até às 16 semanas).
- Se contactar com outros gatos e/ou tiver acesso à rua, deverá testar e vacinar para Leucemia felina (FeLV), a partir dos 6 meses, com reforço 3 a 5 semanas depois.
- Revacinações anuais para ambas as vacinas mencionadas.

Desparasitação

- Interna (para "lombrigas")
 - até aos 3 meses: de 15 em 15 dias.
 - dos 3 aos 6 meses: mensalmente
 - dos 6 meses à idade adulta: de 4 em 4 meses
- Externa (para pulgas, carraças e mosquitos)
 - em comprimido, pipeta ou coleira.

Alimentação

- Água sempre à disposição. Usar fontes ou torneiras para estimular a ingestão de água.
- Alimento seco (ração) à descreção. Alimento húmido diário ou muito frequente.

Outros cuidados

- Escovagem regular do pêlo e dos dentes.
- A esterilização deverá ser efectuada por volta dos 6 meses de idade. O microchip poderá ser colocado nesta intervenção cirúrgica.
- Contacto com outros animais e idas a rua só depois da primovacinação estar completa!

